



Terapia Extendida con Anticoagulantes Después de la Cirugía

Su médico puede recetarle Enoxaparina (una inyección anticoagulante) para usar en casa durante 10 días después de salir del hospital. Este medicamento ayuda a prevenir coágulos de sangre peligrosos mientras se recupera de la cirugía.

¿QUIÉN NECESITA ENOXAPARINA EXTENDIDA?

La terapia extendida con anticoagulantes se recomienda para pacientes con ciertos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar coágulos sanguíneos después de la cirugía.

- **Categoría de Alto Riesgo:** Índice de Masa Corporal (IMC) mayor de 60
- **Coágulos Previos:** Historial de tromboembolismo venoso (TEV)

Importante: Si tiene CUALQUIERA de las condiciones anteriores, califica para la terapia extendida. Continúe leyendo para conocer factores de riesgo adicionales.

FACTORES DE RIESGO ADICIONALES

También puede necesitar terapia extendida si tiene **2 o más** de los siguientes factores de riesgo:

1 Más de 50 Años

Los adultos mayores tienen mayor riesgo de coagulación

2 IMC Mayor de 50

El mayor peso corporal afecta la circulación

3 Sexo Masculino

Los hombres tienen un riesgo ligeramente mayor de coágulos

4 Apnea del Sueño

Las pausas en la respiración durante el sueño aumentan el riesgo

5 Várices

Las venas dilatadas y tortuosas afectan el flujo sanguíneo

6 Insuficiencia Venosa

Retorno deficiente de sangre de las piernas al corazón

7 Uso Reciente de Hormonas

Pastillas anticonceptivas o terapia hormonal dentro de los 30 días previos a la cirugía

POR QUÉ ES IMPORTANTE

Los coágulos de sangre pueden formarse en las piernas o los pulmones después de la cirugía y causar complicaciones graves. La terapia extendida con Enoxaparina reduce significativamente este riesgo durante su período de recuperación, cuando tiene menos movilidad.

Tomar este medicamento según lo recetado durante los 10 días completos le brinda la mejor protección durante la fase crítica de recuperación posoperatoria.

VIDEO: CÓMO INYECTARSE LOVENOX: youtube.com/watch?v=FBrCBlvmYYY

¿TIENE PREGUNTAS?

Comuníquese con su equipo quirúrgico al (831) 768-6266 si tiene dudas sobre si necesita terapia extendida o cómo usar su medicamento de forma segura en casa.